

SUOJAUTUMINEN influenssapotilaan hoidossa (sekä epäilyt että todetut)

KAIKISSA TUTKIMUS- JA HOITOTILANTEISSA (lähikontakti, alle 1 m)

1. Ennen kontaktia ja sen jälkeen käsien desinfektio alkoholihuuhteella tai saippuavesipesu
2. Kertakäyttöiset suojakäsineet aina
3. a) kirurginen suu-nenäsuojus ja suojalasit, b) kirurginen suu-nenäsuojus + kasvovisiiri tai c) visiirimaski
4. Suojaesiliina tai -takki



AEROSOLEJA TUOTTAVISSA TOIMENPITEISSÄ jolloin ilmatartunnan vaara

1. Kaikki yllämainitut toimet
2. Suu-nenäsuojaimen tilalla hengityksensuojain (FFP3 tai FFP2)

AEROSOLEJA TUOTTAVAT TOIMENPITEET

- Liman imu hengitysteistä
- Nebulisaattorihoito
- Bronkoskopia
- Intubaatio
- Resuskitaatio

LISÄTIETOJA

www.thl.fi

Ohje on voimassa toistaiseksi. Sitä päivitetään, mikäli tieto viruksen tarttumistavasta ja tartunnan vakavuudesta muuttuu

