

Kananmunalle allergisten rokottaminen pandemiarokotteella

Kananmunan nauttimisen jälkeen oireita (suun tai nielun kutina, vatsakipu ja ripuli, paikallinen tai yleistynyt urtikaria, muut iho-oireet)

Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma JA kananmunan nauttimisen jälkeen yleistyneitä oireita kuten voimakasta oksentelua tai nokkosihottumaa

Kananmunan nauttimisen jälkeen kardiorespiratorisia oireita tai löydöksiä JA reaktio hoidettu anafylaksiana

Rokota tavalliseen tapaan, ei tarvetta erityistoimenpiteisiin

Rokotus suositellaan annettavaksi terveyskeskuksessa lääkärin valvonnassa, seuranta 1 h

Sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluva

Ei kuulu sairautensa vuoksi riskiryhmään, mutta toivoo rokotusta tai huoltajat toivovat sitä

Herkistynyt kananmunalle (prick tai RAST +), ei tietoa allergiasta huolimatta siitä onko koskaan saanut kananmunaa

Rokotus suositellaan annettavaksi anafylaksian hoitovalmiudessa erikoissairaanhoidon pkl:lla, seuranta 2 h