



## Smärta vid injektion av vaccinet M-M-RvaxPro

THL har fått anmälningar om smärta som förekommit vid injektionen av vaccinet M-M-RvaxPro.

I allmänhet väljs vaccinpreparaten för det nationella vaccinationsprogrammet endast utgående från priset på de preparat som erbjuds. Detta gäller också valet av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR).

Vid valet kan också kvalitetsfaktorer beaktas, i det fallet att det finns objektiv information att tillgå. Det är därför viktigt att en **biverkningsanmälan** enligt normal praxis görs till **THL** om **betydande smärta förekommer vid injektionen**.

Följande åtgärder kan vidtas för att minska smärtan vid injektionen av M-M-RvaxPro-vaccinet:

- Enligt produktresumén kan preparatet injiceras antingen subkutant eller intramuskulärt. **Det lönar sig i allmänhet att injicera preparatet intramuskulärt.** Om preparatet injiceras subkutant är det mer sannolikt att det ger upphov till sveda.
- Förpackningen med M-M-RvaxPro innehåller två nålar. **Injektionen ges med den längre och grövre nålen** (0,6 x 25 mm).

Anmälan om mistänkt vaccinationsbiverkning

[http://www.ktl.fi/attachments/suomi/osastot/roko/rotu/thl\\_roko100\\_aomv\\_ru\\_2\\_.pdf](http://www.ktl.fi/attachments/suomi/osastot/roko/rotu/thl_roko100_aomv_ru_2_.pdf)