

Tietoa Pandemrix-rokotteesta

Teille on tänään ____/____/____ annettu Pandemrix-täsmärokote sikainfluenssaa vastaan.

Rokote sisältää sikainfluenssaviruksen antigeenia (vaikuttava-aine) ja tehosteaineena AS03-adjuvanttia (apuaine). Apuaine on täsmälleen sama kuin Euroopan lääkeviraston hyväksymässä H5N1-lintuinfluenssarokotteessa. Säilyvyyden takaamiseksi rokotteessa on tiomersaalia. Kun tiomersaali hajoaa elimistössä, siitä vapautuva elohopea on sellaisessa muodossa, että se ei kerry elimistöön, vaan poistuu nopeasti.

Rokote ei sisällä eläviä viruksia, vaan tapetun viruksen kappaleita. Nämä eivät voi aiheuttaa influenssaa.

Mahdolliset haittavaikutukset

Pandemiarokotteen odotetaan aiheuttavan enemmän samankaltaisia haittoja kuin kausi-influenssarokotteiden. AS03 on erinomainen tehosteaine, mutta voimistaessaan vasta-aineiden muodostusta se myös herkästi aiheuttaa ärsytystä rokotuskohdassa.

Parin päivän sisällä rokotuksesta pistoskohdassa saattaa ilmetä punotusta, kuumotusta, turvotusta ja kipua. Nämä ovat odotettavia ja normaaleja rokotusreaktioita. Myös rokotuskohdan lähellä olevat imusolmukkeet saattavat turvota.

Yli 10 prosenttia rokotetuista saa yleisoireita kuten lämmönnousua, kuumetta, ärtyneisyyttä, huonovointisuutta tai päänsärkyä. Vaikka nämä rokotusreaktiot voivat olla kiusallisia, ne menevät yleensä nopeasti ohi, ja niitä voi hoitaa. Henkeä uhkaavia tai pitkäaikaisia haittoja rokotteesta ei ole odotettavissa.

Paikallisoireita, särkyä ja kuumetta voi hoitaa tavallisilla kuume- ja kipulääkkeillä.

Mikäli Teille tulee rokotuksen jälkeen muita kuin edellä mainittuja oireita, ottakaa yhteys rokotuksen antaneeseen toimipaikkaan, omaan terveyskeskukseen tai esim. työterveyshuoltoon.